COVID-19: Ambulatorio_CO (v2.1)

Clinical Overview Sinopsis

Infrección por coronavirus (COVID-19)
Seguir recomendaciones de prevención y control de infección intrahospitalaria por SARS-CoV-2/ COVID-19 en Consulta Externa

Evaluación

Evaluación

- [x] Medición de las constantes vitales (FR, SatO2, FC, PA, Tª) 1 vez
- [x] Medición de la temperatura 1 vez
- [x] Evaluación de desplazamientos y riesgo de contacto

Puntuación de gravedad CURB-65

Medicamentos

Analgésicos y antipiréticos

***Manejo en adultos*

- [ ] Acetaminofén 500 mg tableta ; vía oral ; Dosis: 500 mg ; Frecuencia: cada 6 horas ; (PRN: Si Fiebre mayor a 38 C, no superar 4000mg de acetaminofen en 24 Hrs)

***Manejo pediátrico*

- [ ] Acetaminofén Jarabe 160mg/5ml; Vía Oral; Dosis: 10 - 15mg/kg/dosis cada 6 horas; (PRN: dolor leve o fiebre mayor a 38 C); Máximo 60mg/kg/día
- [ ] Acetaminofén Jarabe 250mg/5ml; Vía Oral; Dosis: 10 - 15mg/kg/dosis cada 6 horas; (PRN: dolor leve o fiebre mayor a 38 C); Máximo 60mg/kg/día

Educación y precauciones

Precauciones

- [x] Aislamiento en casa; por 14 días
- [ ] Precaución: aérea
- [ ] Precaución: por contacto
- [ ] Precaución: por gotículas
- [ ] Precaución: estándar

Monitorización domiciliaria

- [ ] Medición de la temperatura 1 vez al día ; en casa

COVID-19: Ambulatorio_CO (v2.1)

Educación del paciente

- ☐ Educación del paciente: infección
- ☐ Educación en monitorización domiciliaria y signos de alarma para reconsultar
- ☐ Educación del paciente: seguimiento médico ; notificar a familiares, parejas, cuidadores y autoridades sanitarias

Laboratorio

Evalúe y documente marcadores de mal pronóstico - COVID-19

Pruebas específicas SARS-CoV-2/COVID-19

Reportar a la entidad distrital o departamental de salud los casos confirmados por SARS-CoV-2/COVID-19

- ☐ RT- PCR de SARS CoV-2 /COVID-19, 1 vez ; aspirado traqueal o aspirado nasofaríngeo u orofaríngeo, o hisopado nasofaríngeo u orofaríngeo; Prueba Inicial

Se recomienda la realización de una segunda prueba de RT-PCR a las 48horas (según disponibilidad), en pacientes con la primera prueba negativa con alta sospecha de neumonía por SARS Cov2 / COVID 19

- ☐ RT- PCR de SARS CoV-2 /COVID-19, 1 vez ; aspirado traqueal o aspirado nasofaríngeo u orofaríngeo, o hisopado nasofaríngeo u orofaríngeo; Prueba 2 (a las 48 Hrs)

- ☐ SARS-COV2/serología lgM/IgG

Remisión Ambulatoria

- ☐ Remisión a centro de mayor complejidad ; en caso de síntomas moderados o severos
- ☐ Consulta especializada Medicina Interna
- ☐ Consulta medicina general ; Motivo de consulta: control médico
- ☐ Consulta especializada Pediatría