

Order Sets

COVID-19 - Alta hospitalar (v1.0)

Visão geral clínica

Os Clinical Overviews do Clinical Key fornecem orientação adicional específica para:

Coronavírus: infecção pelo novo Coronavírus (COVID-19) 

Alta hospitalar

- Alta para casa
- Alta para casa com fisioterapia
- Alta para homecare

Sinais vitais e monitoramento

Monitoramento

- Temperatura 2 vezes ao dia 

Atividade

- Deambulação liberada
- Deambular com auxílio
- Repouso absoluto no leito

Cuidado geral

Educação do paciente

- Educação do paciente: Educação sobre infecção
- Educação do paciente: Ficar em um quarto isolado e quando possível utilizar banheiro separado
- Educação do paciente: Não compartilhar objetos como toalhas e talheres antes de serem higienizados
- Educação do paciente: manter distância de 1-2 metros dos outros membros
- Educação do paciente: usar máscara cirúrgica
- Educação do paciente: Limpeza frequente de superfícies com solução alcoólica 70°
- Educação do paciente: Higiene ao tossir
- Educação do paciente: Monitoramento da temperatura corporal ; Uma vez ao dia pelo menos
- Educação do paciente: Aconselhamento sobre fumo e tabagismo passivo  

Aplicações ortopédicas

Outro

Order Sets

COVID-19 - Alta hospitalar (v1.0)

- Documentar estado de imunização contra a gripe e pneumococo
- Documentar a aceitação ou rejeição de tratamento de uso de tabaco na alta hospitalar i QM
- Documentar a aceitação ou rejeição de tratamento de abuso de álcool/substâncias na alta hospitalar i QM

Dieta

- Dieta: Geral
- Dieta: Geral para diabetes (Restrição de carboidratos)
- Dieta: Pastosa
- Dieta: Disfagia: alimentos pastosos

Medicamentos

Antipiréticos

- Paracetamol 500 mg Comprimido Oral ; 500 mg A cada 4 horas por 7 Dia(s) (PRN: temperatura maior que 38 graus C) (dispensar 50 comprimido(s); 0 refil(s)) ; Não exceder 4000 mg de paracetamol de todos os tipos em 24 horas
- Dipirona 500 mg Comprimido Oral ; 500 mg A cada 4 horas (PRN: temperatura maior que 38 graus C)

Imunizações i

- Vacina Influenza Intramuscular Suspensão injetável; 0,5 mL Uma vez QM
Solução Injetável de vacina pneumocócica polissacarídica 23-valente (VPP23) intramuscular; 0,5 ml uma vez
Seringa pré-carregada com vacina conjugada pneumocócica 13 (PCV13) intramuscular; 0,5 ml uma vez
- Bordetella Pertussis + Toxóide Difterico + Toxóide Tetânico Injeção Intramuscular ; 0,5 mL Uma vez ; vacina combinada
- Difteria Toxóide e Tetano (Vacina Dupla Adulto) Injeção Intramuscular 0,5mL Uma vez a cada 10 anos em casos de trauma/gestação é necessário reforço caso a última dose tenha sido com mais de 5 anos.

Outro

- Fornecer um encaminhamento para aconselhamento ambulatorial sobre tabaco e uma receita para um dos medicamentos aprovados pela FDA para a abandono do tabaco, ou recusar documento i QM
- Cessação de tabagismo - Módulo ambulatorial

Referências

- Referência: Saúde Pública; Histórico: [adicionar diagnóstico, sintoma(s)]; Pergunta: [adicionar motivo para referência/consulta]
- Referência: Atenção Primária; Histórico: [adicionar diagnóstico, sintoma(s)]; Pergunta: [adicionar motivo para referência]

Order Sets

COVID-19 - Alta hospitalar (v1.0)

- Referência: Serviço Social Clínico; Histórico: [adicionar diagnóstico, sintoma(s)]; Pergunta: [adicionar motivo para referência]
 - Referência: Aconselhamento sobre abuso de álcool / substâncias; Histórico: [adicionar diagnóstico, sintoma(s)]; Pergunta: [adicionar motivo para referência]  
 - Referência: Abandono do hábito de Fumar / Aconselhamento sobre abstinência de tabaco; Histórico: [adicionar diagnóstico, sintoma(s)]; Pergunta: [adicionar motivo para referência]  
-